Бхайшаджйа кала - время назначения лекарств.

- 1. *Абхакта* на пустой желудок. Лекарства проявляют самое сильное действие, когда приняты на пустой желудок. Поэтому данный способ приема предписывают людям с достаточным количеством *балы* (силы) и при болезнях *капхи*.
- 2. *Прагбхакта* перед едой. Применяется при болезнях *апанавайу*, а также для тонизации кишечной мускулатуры и для редуцирования жиров.
- 3. *Мадхйабхакта* в середине приема пищи. При болезнях *саманавайу* и расстройствах пищеварения, особенно *питта* типа.
- 4. Адхобхакта после еды. После завтрака лекарства принимаются при болезнях вйанавайу. После обеда при болезнях уданавайу. Этот способ приема лекарств укрепляет верхнюю часть тела и используется для брихманы (питательной тонизации) и лечит болезни, располагающиеся в верхней части тела, особенно те, что имеют природу капхи.
- 5. Самабхакта лекарство, смешанное с пищей. Такой способ подходит для детей, нежных и утонченных личностей и для тех, у кого есть отвращение к лекарствам. Также для лечения аручи (анорексии) и при болезнях, распространившихся по всему телу.
- 6. Антарабхакта днем, между обедом и ужином. Такой способ приема предполагает момент завершения переваривания пищи, принятой за обедом и не менее часа до ужина. Идеально если этот момент приходится на середину периода между обедом и ужином. Подходит для тех, у кого хорошее пищеварение и при болезнях вйанавайу.
- 7. Самудга до и после еды. Пачана, авалеха, чурна и другие лекарственные формы принимаются непосредственно до и после приема пищи легкой пищи при икоте, треморе, конвульсиях и спазмах. При одновременной локализации болезни в верхних и нижних частях тела и при болезнях бедер.
- 8. *Мухух-мухух* время от времени, «через час по чайной ложке». Этот способ приема не предполагает привязки к приему пищи или наличие пустого желудка. Лекарство принимается часто, через определенные промежутки времени при одышке, астме, кашле, икоте, жажде, тошноте и отравлениях.
- 9. *Саграса* с первым куском пищи. Лекарство смешивается с первым куском пищи, принимается и затем доедается остальная часть пищи. *Чурна, ватика, леха* и другие лекарственные формы принимаются таким способом для дипаны и ваджикараны. Прием хингваштхака чурны идеальных пример для данного способа приема лекарств. Также используется при расстройствах пранавайу.
- 10. *Грасантара* между каждым куском или ложкой пищи. Лекарство перемежается пищей. При болезнях *пранавайу*, особенно располагающихся в сердце.
- 11. *Ниша* на ночь. Данный способ приема назначается при болезнях головы, ротовой полости, глаз, ушей, носа и горла. *Вамана* (средства способствующие выделению *капхи* (не путать с рвотной терапией!).

Андрей Головинов ayurvedika.ru vk.com/ayurvedika